



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



CARATTERI DA RILEVARE SULL'ACCESSIONE, DURANTE LA CRESCITA E LA RACCOLTA

N° di semina	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome specie e varietà del seme	Phaseolus vulgaris America Costa Rica (ECa079)	Phaseolus vulgaris America Venezuela (ECa094)	Phaseolus vulgaris Europa Georgia cespuglio (ECa217)	Phaseolus vulgaris Europa Spagna rampicante (ECa319)	Fagiolo «Borlotto lingua di fuoco»	Phaseolus vulgaris «Purple Queen»	Fagiolo «Slanderette »	Fagiolo «Giallo mangiatutto»
Tipo di crescita	rampicante	cespuglio	cespuglio	rampicante	nano	nano	nano	nano
Peso del seme (g)	0.47	0.23	0.44	0.64	0.45	0.22	0.28	0.32
Colore del seme	Nocciola	Nero	Bianco sporco striato viola	Bianco	Rosa striato viola	Marroncino	Bianco	Nero
Lunghezza del seme	0.5	0.3	1.1	1	0.5	0.5	1	0.6
Larghezza del seme	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
Spessore del seme								
Data di semina su terra	6/04/2017							



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



CARATTERI DA RILEVARE SULL'ACCESSIONE, DURANTE LA CRESCITA E LA RACCOLTA								
N° di semina	1	2	3	4	5	6	7	8
Data di emergenza da terra								
N° di foglie cotiledonari (le prime foglie che si aprono dopo l'emergenza)								
Colore epicotile (del fusto)								
Data di fioritura								
Colore del fiore								
Data del primo baccello (l'inizio della formazione da fiore a baccellino)								
Data di termine fioritura								
Tipo di apice terminale (la pianta termina con apici vegetativi o a								



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



fiore?)								
CARATTERI DA RILEVARE SULL'ACCESSIONE, DURANTE LA CRESCITA E LA RACCOLTA								
N° di semina	1	2	3	4	5	6	7	8
Colore dei baccelli a maturazione								
Numero di baccelli raccolti per pianta								
Peso dei baccelli raccolti								
Numero di semi sgranati per pianta								
Numero di semi per baccello								
Colore dei semi raccolti								
Peso dei semi raccolti								
Altro								
Altro								
Altro								
Altro								
Altro								